



Wichtige Informationen für Daratumumab-Patienten

Bitte tragen Sie diesen Ausweis immer bei sich.

Legen Sie diesen Ausweis jedem behandelnden Arzt vor,
insbesondere vor einer Bluttransfusion.

Sie sollten dies tun, während Sie Daratumumab erhalten und
mindestens bis 6 Monate nach der letzten Behandlung mit
Daratumumab.

Ende der Daratumumab-Therapie am: / /

Weitere Informationen finden Sie in der Gebrauchsinformation.

Version 5, Stand: November 2021,
erstellt in Abstimmung mit dem Paul-Ehrlich-Institut

**Falls Sie weitere Informationen benötigen,
kontaktieren Sie bitte den medizinischen
Informationsdienst unter:**

Janssen-Cilag GmbH

Johnson & Johnson Platz 1
41470 Neuss
Telefon: +49 2137 955-955
E-Mail: jancil@its.jnj.com



Mat.-Nr. 100118675

Patientenausweis

Behandlung mit DARZALEX® (Daratumumab)



Wichtige Informationen vor Bluttransfusionen

Name des Patienten

Geburtsdatum des Patienten

Ich erhalte das folgende Medikament: Daratumumab, einen vollhumanen Antikörper, für die Behandlung des Multiplen Myeloms oder für die Behandlung der systemischen Leichtketten-(AL-)Amyloidose.

Wichtige Information für Ärzte:

Daratumumab beeinflusst die Tests vor einer Bluttransfusion. Der indirekte Antiglobulintest (Antikörpersuchtest, indirekter Coombs-Test) und die Kreuzprobe können ein falsch positives Ergebnis zeigen. Die Interferenz kann bis zu 6 Monate nach Absetzen von Daratumumab andauern.

Durch ein spezielles Laborverfahren (Behandlung der Testerythrozyten mit DTT [Dithiothreitol]) wird die Interferenz aufgehoben und der Antikörpersuchtest und die Kreuzprobe sind durchführbar, beschrieben u.a. von Chapuy et al., in der Zeitschrift „Transfusion“ (Transfusion. 2015 Jun;55: 1545-54) <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/trf.13069/epdf>

Die Bestimmung der ABO- und Rhesus-Blutgruppe sowie der „Bedside-Test“ sind nicht beeinträchtigt.

Im Falle einer Notfalltransfusion, sollten Patienten gegebenenfalls mit ungekreuzten, ABO/RhD-kompatiblen Erythrozytenkonzentraten versorgt werden, entsprechend lokaler Vorgehensweisen.



Die Blutbank muss über die Daratumumab-Therapie informiert sein, um Verzögerungen in der Bereitstellung geeigneter Blutkonserven zu vermeiden.

Behandelnder Arzt des Patienten:

Name

Adresse

Telefon

Vom Arzt auszufüllen:

Vor Beginn der Daratumumab-Behandlung sollten die folgenden Untersuchungen durchgeführt werden:

Datum der Blutabnahme: _____

Blutgruppenbestimmung: A B AB 0

Rhesus: Rh+ Rh- Rhesusformel: _____

Antikörpersuchtest: Negativ Positiv für folgende Antikörper:

Kontaktdaten des Labors, in dem die Bluttests durchgeführt wurden:
