



Wichtige Informationen für Daratumumab-Patienten

Bitte tragen Sie diesen Ausweis immer bei sich.

Legen Sie diesen Ausweis jedem behandelnden Arzt vor, insbesondere vor einer Bluttransfusion.

Sie sollten dies tun, während Sie DARZALEX® erhalten und mindestens bis 6 Monate nach der letzten Behandlung mit DARZALEX®.

Ende der DARZALEX® Therapie am: / /

Weitere Informationen finden Sie in der Gebrauchsinformation.

Version 3, Stand: Juli 2018,
erstellt in Abstimmung mit dem Paul-Ehrlich-Institut

**Falls Sie weitere Informationen benötigen,
kontaktieren Sie bitte den medizinischen
Informationsdienst unter:**

Janssen-Cilag GmbH

Johnson & Johnson Platz 1
41470 Neuss
Telefon: +49 2137 955-955
E-Mail: jancil@its.jnj.com



Mat.-Nr. 100T15363

Patientenausweis

Behandlung mit DARZALEX® (Daratumumab)



Wichtige Informationen vor Bluttransfusionen

Name des Patienten

Geburtsdatum des Patienten

Ich erhalte das folgende Medikament: DARZALEX® (Daratumumab),
einen vollhumanen Antikörper, für die Behandlung des Multiplen Myeloms.

▼ Dieses Arzneimittel unterliegt einer zusätzlichen Überwachung. Dies ermöglicht eine schnelle Identifizierung neuer Erkenntnisse über die Sicherheit. Sie können dabei helfen, indem Sie jede auftretende Nebenwirkung melden.

Wichtige Information für Ärzte:

DARZALEX® beeinflusst die Tests vor einer Bluttransfusion. Der indirekte Antiglobulintest (Antikörpersuchtest, indirekter Coombs-Test) und die Kreuzprobe können ein falsch positives Ergebnis zeigen. Die Interferenz kann bis zu 6 Monate nach Absetzen von Daratumumab andauern.

Durch ein spezielles Laborverfahren (Behandlung der Testerythrozyten mit DTT [Dithiothreitol]) wird die Interferenz aufgehoben und der Antikörpersuchtest und die Kreuzprobe sind durchführbar, beschrieben u.a. von Chapuy et al., in der Zeitschrift „Transfusion“ (Transfusion. 2015 Jun;55: 1545-54) <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/trf.13069/epdf>
Die Bestimmung der ABO- und Rhesus-Blutgruppe sowie der „Bedside-Test“ sind nicht beeinträchtigt.

Im Falle einer Notfalltransfusion, sollten Patienten gegebenenfalls mit ungekreuzten, ABO/RhD-kompatiblen Erythrozytenkonzentraten versorgt werden, entsprechend lokaler Vorgehensweisen.



Die Blutbank muss über die Daratumumab-Therapie informiert sein, um Verzögerungen in der Bereitstellung geeigneter Blutkonserven zu vermeiden.

Behandelnder Arzt des Patienten:

Name

Adresse

Telefon:

Vom Arzt auszufüllen:

Vor Beginn der Daratumumab-Behandlung sollten die folgenden Untersuchungen durchgeführt werden:

Datum der Blutabnahme: _____

Blutgruppenbestimmung: A B AB 0

Rhesus: Rh+ Rh- Rhesusformel: _____

Antikörpersuchtest: Negativ Positiv für folgende Antikörper:

Kontakt Daten des Labors, in dem die Bluttests durchgeführt wurden:
